## ÉPOCA DE EMPLEO

En primavera se pueden colocar de 1 a 3 trampas por hectárea para la detección de la plaga y la observación del nivel de sus poblaciones. Mediante umbrales de tolerancia establecidos en cada zona, se define después el momento para adoptar medidas de biocontrol. El umbral de tolerancia para *Ceratitis capitata* es muy bajo y varía según la zona y tipo de trampas utilizadas. De forma muy general se puede decir que está entre 0,5 y 3 capturas por trampa y día.

### ¿Cuándo se deben colocar los difusores y las trampas?

Los difusores de feromona y de atrayentes deben colocarse en los cultivos antes del inicio del vuelo del insecto objetivo y mantenerse activos hasta 2 o 3 semanas después del pico del vuelo.




Es preferible colocar los difusores y las trampas antes de tiempo y mantenerlos hasta que se detengan totalmente las capturas.

**SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.** garantiza, únicamente, la composición, formulación y contenido de los productos, siendo responsable de los daños y perjuicios que tengan su causa directa, inmediata y exclusiva en la composición, formulación y contenido de los productos comercializados. **SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.** no tendrá ninguna responsabilidad por los daños en cuya producción haya contribuido, total o parcialmente, factores ajemos a la empresa como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatologçia, la aplicación o la mezcla con otros productos. Asímismo, **SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.** facilitará recomendaciones e información sustentada en amplios y regurosos estudios y ensayos. que deberán ser observadas por el usuario en la utilización de los productos. El usuario será responsable de cualquier daño causado, en todo o en parte, por la inobservancia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.

ECONEX® FEROMONAS Y TRAMPAS
Desde 1986
1986 - 2026 ANIVERSARIO

# ECONEX TRYPACK® COMPACT

www.ceratitiscapitata.es

ESCAÑEAME

VISITA NUESTRA WEB CORPORATIVA

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE

SIGUENOS EN: Linkedin y Youtube

| CÓDIGO | NOMBRE COMERCIAL | IMAGEN |
|---|---|---|
| UIPHOVA375 | ECONEX TRYPACK® COMPACT 120 DÍAS ENV. 1UD. Difusor de atrayente para *Ceratitis capitata* con 120 días de duración. | |
| UIPHOVA397 | ECONEX TRYPACK® COMPACT 120 DÍAS ENV. 50 UD. | |
| UIPHOVA377 | ECONEX TRYPACK® COMPACT SÚPER 120 DÍAS ENV. 1UD. Difusor de atrayentes para *Ceratitis capitata* con 120 días de duración. | |
| UIPFETA250 | ECONEX TRAMPA BOTELLA | |

**Servicio en 24 / 48 h.** España peninsular | Otros destinos consultar

GLS General Logistics Systems · DACHSER Intelligent Logistics · DHL

QUEREMOS QUE TE SIENTAS ORGULLOSO DE TUS CULTIVOS

SEAL OF EXCELLENCE · PYME INNOVADORA

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SIGFITO

**SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L**
**CIF / VAT: ESB73108748**
**C/ Mayor, Nº 15 Bis - Edificio ECONEX, 30149**
**SISCAR - Santomera - MURCIA (España, UE)**

**Atención al cliente: 900 502 401**
**Tel. + 34 968 86 03 82 / +34 968 86 40 88**
**Web: www.e-econex.com**
**E- mail: econex@e-econex.com**

**DISTRIBUIDO POR:**

**PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA**

© SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L., 2025

# ECONEX TRYPACK® COMPACT

## BIOCONTROL

Atrayentes específicos de hembras y machos de *Ceratitis capitata*

www.ceratitiscapitata.es

ECONEX® FEROMONAS Y TRAMPAS
Desde 1986
1986 - 2026 ANIVERSARIO

## DESCRIPCIÓN

| CÓDIGO | NOMBRE COMERCIAL |
|---|---|
| UIPHOVA375 | ECONEX TRYPACK® COMPACT 120 DÍAS ENV. 1 UD.<br>Difusor de atrayentes alimenticios específicos de hembras y machos *Ceratitis capitata*, con una duración en campo de 120 días. |
| UIPHOVA397 | ECONEX TRYPACK® COMPACT 120 DÍAS ENV. 50 UD.<br>Número de registro OMDF (Ministerio de Agricultura de España): **022/2019** |
| UIPHOVA377 | ECONEX TRYPACK® COMPACT SÚPER 120 DÍAS ENV. 1 UD.<br>Difusor de atrayentes alimenticios y 1 feromona para atraer hembras y machos de *Ceratitis capitata*, con una duración en campo de 120 días.<br>Número de registro OMDF (Ministerio de Agricultura de España): **023/2019** |

Los difusores de **ECONEX TRYPACK® COMPACT 120 DÍAS ENV. 1 UD.** tienen forma de blister, con una duración en campo de 120 días, y están envasados individualmente en sobre de aluminio con etiqueta de especificaciones. También se comercializan en envases de 50 unidades.

**ECONEX TRYPACK® COMPACT SUPER120 DÍAS** está compuesto por un difusor en forma de blíster con los 3 atrayentes alimenticios y un difusor en forma de cilindro de fibras absorbentes con la feromona. Ambos difusores están envasados en un sobre de aluminio con etiqueta de especificaciones.

Una vez extraído del envase, el difusor no necesita ninguna operación de activación, ni debe abrirse, tan sólo colocarse adecuadamente en la trampa.

**ECONEX TRYPACK® COMPACT 120 DÍAS ENV. 1 UD.**
envase de 1 unidad y difusor de atrayente en vista frontal.
Código: UIPHOVA375

**ECONEX TRYPACK® COMPACT SÚPER 120 DÍAS ENV. 1 UD.**
envase atrayente en vista frontal
Código: UIPHOVA377

## MATERIAL NECESARIO

Podremos usar una trampa **ECONEX TRAMPA BOTELLA.** Las trampas se activan al colocar el difusor de atrayentes en el interior de las mismas.

Código: **UIPFETA250**
**ECONEX TRAMPA BOTELLA**

### FUNCIONAMIENTO DE LA TRAMPA:

**4 agujeros de entrada:**

Agujeros transversales con insertos que facilitan la entrada de los insectos, tanto por atracción cromotrópica como por su forma de embudo, impidiendo además su salida.

**Atrayente:**

Espacio para la colocación del difusor y la retención de una gran cantidad de capturas.

### Consejos de uso:

No necesita ningún tipo de activación, tan solo colocar el difusor en el interior de la trampa..

Colgar la trampa de una rama, entre 1,5 y 2 m de altura, en la parte soleada del árbol.

Para la revisión de las capturas, filtrar el contenido de la trampa con un colador.

En el campo tiene una duración aproximada de 120 días, dependiendo de la temperatura, humedad relativa, grado de exposición al sol.

**NOTA: Introducir el atrayente específico de la plaga objetivo.**

## SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO

Se capturan las hembras de la *Ceratitis capitata*, aunque también algunos machos de esta especie, con el fin de reducir los apareamientos, por lo que las hembras no copuladas tendrán huevos inviables. De este modo simultáneo se reduce mucho la población de la plaga. Para este fin el usuario puede aumentar la cantidad de trampas por superficie, según situación y homogeneidad de las parcelas.

Una trampa controla una superficie entre 500 y 1.000 m$^2$. Se deben colocar en la cara sur de los árboles a una altura de 1,5 a 2 metros.

En los bordes de las parcelas serán necesario colocar una barrera de trampas, separadas entre sí de 10 a 15 metros.

## ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Los difusores deben conservarse en su envase original y en refrigerador a 4ºC; o en el cogelador a -18ºC, en cuyo caso se mantendrán vigentes durante 2 y 4 años respectivamente. Mantener alejados de alimentos y bebidas.